



2 地図で表した直近 3 週間の区別流行状況(塗り分けの数字は定点あたり報告数)




※参考リンク

近隣自治体の流行状況



- [神奈川県](#)
- [川崎市](#)
- [東京都](#)

全国の流行状況


- [国立感染症研究所](#)



3 年齢層別患者報告数:直近 5 週間の患者年齢構成では、第 2 週以降 10 歳代未満の患者が増加し、第 3 週、第 4 週とも全体の約 6 割を占めています。10 歳未満の中では、5 歳以上の集団生活を送っている年齢層が多く占め、学校や幼稚園等での予防が重要です。




4 学級閉鎖施設数:市内の学級閉鎖は第 1 週、第 2 週とも報告はありませんでしたが、第 3 週は閉鎖施設数が 32、第 4 週は 92 と激増しています。第 4 週の閉鎖施設の内訳は、小学校 77、幼稚園 7、中学校 7、高校 1 と、**小学校が全体の 83.7%** を占めています。閉鎖施設は、第 5 週に入っても続々と報告されています。




5 入院サーベイランス:市内基幹定点医療機関^{※3}におけるインフルエンザ入院患者は、第2週の4人から、第3週は8人と倍増しました。10歳未満が5割を占めています。なお、第4週は2月3日現在4施設の基幹定点医療機関のうち、2施設からの報告のため、実際の入院患者数より少ない集計結果となっている可能性があります。

※3 基幹定点:患者を300人以上収容する病院(小児科医療と内科医療を提供しているもの)の中から、地域ごとに指定された医療機関のことで、市内には4つの基幹定点があります。




6 インフルエンザ脳症:第3週に1件(10歳代)の報告があり、**AH1pdm09**が検出されています。インフルエンザの重症化に注意が必要です。


7 迅速キット結果:市内医療機関における迅速キットの結果では、第4週はA型74.8%、B型24.9%、ABとも陽性0.3%でした。第3週のA型76.9%、B型22.6%、ABとも陽性0.6%と比べると、ほとんど型別の割合には変化が見られませんでした(P=0.066)。



8 市内病原体検出状況:市内では病原体定点からAH1pdm09が最も多く分離・検出されていますが、第4週はB型(Victoria系統)3件、B型(山形系統)1件、AH3型1件が検出されています。



9 分離株の抗原性解析:市内で検出された AH1pdm09 株(61 株)、B 型(Victoria 系統)株(23 株)と B 型(山形系統)株(1 株)では、ワクチン株との抗原性解析(HI 試験)は、**すべて HI 価 4 倍以内**でした。AH3 株(4 株)はすべて **HI 価 8 倍**でした。一般的に 4 倍以内でワクチン株と類似していると言われていています。ただ、今回の解析にはウサギの血清を使っており、参考値です(B 型(山形系統)のみフェレット血清を使用)。正式な結果は国立感染症研究所での分析を待つ必要があります。



なお、国立感染症研究所からも、横浜市で分離された AH3 型のうち、2 株の抗原性解析結果が報告され、**16 倍以上の中和反応性低下(ワクチン株から変異している)**がみられました。AH1pdm09 型は 10 株の抗原性解析結果が報告され、すべて **2 倍以内(ワクチン株と類似)**でした。また、国立感染症研究所から横浜市で分離された B 型(Victoria 系統)(1 株)の薬剤感受性検査結果が報告されましたが、オセルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビルへの**耐性はありませんでした**(2 月 3 日現在)。

※ 週ごとの定点あたり報告数の変動について

流行情報発行後に医療機関から追加報告が寄せられることがあるため、週ごとの定点あたり報告数が変動することがありますのでご注意ください。

【お問い合わせ先】 横浜市健康福祉局健康安全課 TEL 045 (671) 2442
 横浜市衛生研究所感染症・疫学情報課 TEL 045 (370) 9279